

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
Aalgésicos	Dipirona sódica; Novalgina	Liberado para doação
	Dorflex	
	Dorilax	
	Paracetamol; Tylenol	
Anorexígenos	Sibutramina	07 dias após a interrupção
Anti hipertensivos e outros medicamentos cardiológicos	Amiodarona; Ancoron	Enquanto estiver em uso
	Atenolol; Propranolol; Bisoprolol; Carvedilol; Metoprolol	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Captopril; Enalapril	Liberado para doação, exceto doação por aférese
	Clonidina	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Doxazosina; Tansulosina	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Cloridrato de Hidralazina	05 dias após a suspensão do medicamento
	Losartana; Valsartana; Candesartana; Irbesartana; Eprosartana; Telmisartan	Liberado para doação
	Metildopa; Aldomet	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Minoxidil	Apto após 05 dias de suspensão. Caso seja uso tópico, está liberado para doação

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
Anti hipertensivos e outros medicamentos cardiológicos	Nifedipina; Amlodipina; Felodipina; Lacidipina; Diltiazem; Verapamil; Mebefradil	Liberado para doação
	Oxprenolol	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Minipress - Prazosina	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Reserpina	Apto após 48 horas de suspensão, avaliado caso a caso
	Revartio; Viagra	Apto após 05 dias de suspensão do medicamento. Caso seja uso tópico, está liberado para doação
	Cialis	Apto após 05 dias de suspensão do medicamento. Caso seja uso tópico, está liberado para doação
Anti-inflamatórios	AAS (Ácido Acetilsalicílico); Aspirina; Melhoral infantil	Não contraindicam a doação, porém não deve ser preparado concentrado de plaquetas se o remédio foi usado nos últimos 03 dias
	Butazil; Butazolidina; Butacid; Butazona Cálcica	
	Diclofenaco (Cataflam; Deltaren; Voltaren)	
	Feldene (Piroxicam)	
	Meloxil; Movatec (Moxicam)	
Antiagregantes plaquetários	Brilinta	7 dias
	Effient	3 dias
	Plavix (Clopidogrel)	14 dias

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
	Ticlid	14 dias
	Vorapaxar	30 dias
Anticoagulante subcutâneo	Heparina	10 dias após a interrupção
	Clexane; Lovenox (Enoxaparina Sódica)	02 dias após a interrupção
Anticoagulante oral	Marevan; Coumadin (Varfarina)	10 dias após a interrupção
	Xarelto (Rivaroxaban); Pradaxa; Eliquis; Lixiana; Arixtra; Fragmin	02 dias após a última dose
Antibióticos	-	14 dias após término do tratamento, independente da classe do antibiótico
Anticoncepcionais	-	Liberado para doação
Anticonvulsivantes	Ácido valpróico; Carbamazepina; Lamotrigina; Fenobarbital; Topiramato; Pregabalina; Oxcarbazepina; Canabidiol oral;	10 dias após a suspensão pelo médico assistente

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
Antidepressivos e Ansiolíticos	Amitriptilina; Nortriptilina; Alprazolam; Diazepam; Clonazepam; Fluoxetina; Desvenlafaxina; Duloxetina; Escitalopram; Sertralina; Venlafaxina; Paroxetina	03 dias se dosagem ACIMA de 03 (três comprimidos por dia)
Antidepressivos	Bup® (Bupropiona)	Liberado para doação
	Donaren® (Trazodona)	02 dias após suspensão
	Luvox®	03 dias após suspensão
Antienxaquecoso	Sumax®	02 dias após suspensão
	Naramig®	
Antidiabéticos e análogos do GLP-1	Insulina	Recusa definitiva
	Liraglutida (Victoza® / Saxenda®)	
	Dulaglutida (Trulicity®)	
	Semaglutida (Ozempic® / Rybelsus® / Wegovy®)	Apto a doação SE: Utilizado com prescrição médica, não esteja com efeitos colaterais ativos e nos casos de uso subcutâneo, não compartilhe seringas, canetas ou agulhas
	Exenatida (Byetta® / Bydureon®)	
	Lixisenatida (Lyxumia®)	

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
	Tirzepatida (Mounjaro®)	
Antidiabéticos Orais	Daonil® (Glibenclamida)	02 dias após suspensão
	Diamicron® (Glicazida)	Contraindicado doação devido aos possíveis efeitos deletérios sobre o desenvolvimento fetal
	Glucofage® (Metformina)	Liberado para doação
	Stanglit®	03 dias após suspensão
	Jardiance	05 dias após suspensão
	Xigiduo Forxiga	05 dias após suspensão
	Nesina®	03 dias após suspensão
	Januvia	05 dias após suspensão
	Galvus	02 dias após suspensão
Antifúngico Tópico	Cetoconazol Miconazol Nistatina Tioconazol	Liberado para doação
Antifúngico Oral	Fluconazol Cetoconazol Itraconazol	Apto se utilizado para onicomicose. Para outros motivos avaliado caso a caso.
Antirretrovirais Pré infecção pelo HIV INJETÁVEL	Apretude	02 anos (24 meses)
Antirretrovirais Pré e Pós infecção pelo HIV	Truvada Descovy	06 meses após o término
	Tivicay	
	Isentress	

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
Antirretroviral Terapia Tratamento do HIV - TARV	-	Inapto definitivo
Antimetabólico - usado para artrite	Metotrexato	Inapto definitivo se utilizado para tratamento de câncer ou doenças reumatológicas
Antigotoso	Alopurinol	03 dias após a última dose
Antiparasitários	Benzimidazol	Liberado para doação
	Pantelmin	
	Albendazol (Zentel®)	
	Tiabendazol (Foldan®)	
	Cambendazol (Cambem®)	
	Flubendazol (Fluvermal®)	
	Piperazina (Pripsen®)	
	Annita	06 horas após a última dose
	Ivermectina	07 dias após a última dose
Antimalárico	Cloroquina ou Hidroxicloroquina	60 dias após a última dose
Antiparkinsonianos	Prolopa	Inapto definitivo
Antipsicóticos	Clorpromazina	07 dias após suspensão pelo médico assistente e avaliado, caso a caso, pelo médico do Hemocentro
	Haloperidol	
	Quetiapina	
	Sulpirida	
	Olanzapina	
	Risperidona	
	Ziprasidona	
Antihistamínico	Loratadina Polaramine Hidroxizina Desloratadina Difenidramina	03 dias após se assintomático

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
Antivertiginoso	Allegra Betaserc® (Betaistina)	Apto após 01 dia sem a medicação
Corticosteróides sistêmicos	-	48 horas após suspensão (a depender da doença para o qual foi indicado)
Diuréticos	Lasix (Furosemida) Clorana (Hidroclorotiazida) Aldactone (Espironolactona) Moduretic	Liberado para doação
Hipnótico	Zolpidem	Liberado para doação
Hipolipemiantes	Claripex Crestor / Rosucor (Rosuvastatina) Davistar Lipitor (Atorvastatina) Lipofacton Lovast, Lovaton, Mevacor Mevalutin Zocor (Sinvastatina)	Liberado para doação, desde que colesterol e triglicérides estejam controlados
Hormônio gonadotrófico hipofisário humano	Ganirelix, Orgalutran (LH - Hormônio luteinizante recombinante) LH - Hormônio luteinizante Gonal - f, PuregSon	Liberado para doação Inapto definitivo Liberado para doação

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
	Fostimon - M	Inapto definitivo
	Menopur, Merional	Inapto definitivo
Hormônio Masculino	Testosterona Via Oral, Tópica ou Parenteral <u>Prescrito</u>	06 meses após suspensão
Imunossupressor	Cellcept	06 semanas
Medicamentos Teratogênicos	Ladogal (Danazol)	06 meses após interrupção
	Roacutan, Accutane	01 mês após a última dose (usado para acne) inclusive o uso tópico
	Avodart (Dutasterida)	06 meses após a última dose (usado para hiperplasia benigna de próstata)
	Carbolitium (Carbonato de Lítio)	01 mês após a interrupção da medicação
	Dostinex	01 mês após a interrupção da medicação
	Proscar, Propécia, Finalop, Prostide (Finasterida)	01 mês após a interrupção (usado para hiperplasia benigna de próstata ou para alopecia)
	Sonidegib	24 meses após a última dose
	Soriatane	03 anos após a interrupção do uso do medicamento (usado para psoríase)
	Tegison	Inaptidão definitiva (usado para psoríase)
	Vismodegib	24 meses após a última dose

Categoria	Medicamento	Tempo de recusa a doação de sangue
	Aubagio	24 meses após a última dose (usado para esclerose múltipla)
	Arava	24 meses após a última dose (usado para artrite reumatóide)
	Thalomid (Talidomida)	01 mês após a última dose
	Tacrolimus	Via Oral ou tópico em área extensa por mais de 3 semanas: inapto por 6 meses. Colírio: apto
Neurotoxina	Botox (Toxina Botulínica)	Inapto até completar 15 dias após a última injeção
Psicoestimulante	Ritalina; Venvanse	Se usado para transtorno de déficit de atenção, apto após 24 horas sem a medicação
Relaxante Muscular	Miosan® (Ciclobenzaprina)	05 dias após a última dose
Vasoprotetores Sistêmicos	Daflon Venalot Diosmin Perivasc	Liberado para doação

23/12/2025